

Caribou montagnard de la Gaspésie

Processus de rétablissement et état de situation

Le rétablissement des espèces fauniques menacées ou vulnérables au Québec



Marc L'Italien, Parc national de la Gaspésie


Loi sur les espèces
menacées ou
vulnérables (EMV)



Liste EMV

Règlement sur les
espèces menacées ou
vulnérables

Statut et
définition




Loi sur la³
conservation et la
mise en valeur de la
faune



Règlement sur les
habitats fauniques

Cartographie et
normes



Habitat légal d'une
EMV

Le rétablissement

Le processus à la suite d'une désignation

- Formation d'une Équipe de rétablissement
- Préparation d'un plan de rétablissement (10 ans)
- Dépôt du plan (recommandations au MFFP)
- Mise en œuvre (plan d'action)
- Mise à jour du plan (10 ans) (Équipe de rétablissement)

Le rétablissement

Contenu des plans de rétablissement

- État de situation (biologie, tendance de population, description des menaces, etc.)
- Potentiel de rétablissement et avis du comité
- But et objectifs du plan
- Liste de mesures recommandées par l'Équipe de rétablissement (avec priorités, indicateurs et partenaires potentiels)




Caribous de la Gaspésie État de situation

**Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Direction générale du secteur sud-est**


Caractéristiques propres au caribou forestier ou montagnard

Parmi les cervidés du Québec, le caribou est celui qui présente le **plus faible potentiel reproducteur** :


- âge à la première reproduction **plus tardif** des femelles caribous;
- naissance d'**un seul jeune par femelle par année**, alors que les autres cervidés ont fréquemment des jumeaux.



Caribou



Orignal



Cerf de Virginie

Ces particularités biologiques font que le **potentiel de croissance annuelle** et la **capacité de renouvellement** d'une population de caribous sont plus **faibles** que ceux des autres populations de cervidés.

Caractéristiques propres au caribou forestier ou montagnard



- **Habitat**

- Écotype associé aux **peuplements résineux matures et non perturbés** qui renferment les **lichens terrestres ou arboricoles**, base du régime alimentaire du caribou en hiver.



Caractéristiques propres au caribou forestier ou montagnard

- **Utilisation de l'espace**

- Le caribou forestier est considéré comme **sédentaire** :
 - déplacements saisonniers/altitudinal de distances modérées
 - domaines vitaux de quelques dizaines à plus de 4 000 km².

- **Sélection d'habitat**

- **Femelles à la période de mise bas :**

- isolement les unes des autres afin de donner naissance à l'abri des prédateurs;
- fidélité interannuelle au site de mise bas.

- **Habitat d'hivernage** : regroupements à proximité des sites riches en lichens.



Caractéristiques propres au caribou forestier ou montagnard

- **Taille de la population :**
 - vit en petites populations (quelques centaines d'individus) ou petits groupes;
 - faibles densités : 1 à 3 individus par 100 km².



Par sa biologie et son écologie, le caribou forestier est une **espèce sensible** aux **perturbations et aux modifications de son habitat**.

L'histoire d'une régression suivi d'un déclin

- À la suite de la colonisation par les Européens :
 - régression de l'aire de répartition vers le nord;
 - disparition des hardes au sud;
 - déclin de la taille des populations.

Facteurs en jeu :

- altération de l'habitat;
- chasse sportive;
- prédation.



Figure 1. Aire de répartition (c.-à-d. zone d'occurrence) du caribou boréal au Canada. L'aire de répartition actuelle du caribou boréal est indiquée en brun. L'extrémité sud estimée de l'aire de répartition historique du caribou des bois est marquée par la ligne pointillée.



Plan de rétablissement du caribou forestier au Québec (2013-2023)

Québec

Facteurs limitants et menaces

Plusieurs facteurs de mortalités peuvent influencer la dynamique des populations de caribous

Perte et modification de l'habitat

activités humaines, perturbations naturelles
principalement (p. ex., feux de forêt,
l'aménagement forestier épidémie d'insectes)

Prédation – favorisée par
l'altération de l'habitat

Chasse par les nations autochtones
à des fins alimentaires, rituelles ou
sociales



Dérangement anthropique

- activités industrielles
- activités récréotouristiques


Prélèvements illégaux

Accidents routiers

Maladies et parasites

Préoccupations, facteurs limitants et menaces

Augmentation de la prédation liée à l'aménagement forestier



Légende

- Habitat légal
- Aire de répartition
- Parc national de la Gaspésie
- Réserve faunique des Chic-Chocs
- Réserve faunique de Dunière
- Réserve faunique de Matane
- ZEC Cap-Chat
- Kernel 98

Réalisation

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Direction de la gestion de la faune
de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine
Mathieu Morin, biologiste
Ste-Anne-des-Monts, 2019-02-19
Note : Le présent document n'a aucune portée légale
© Gouvernement du Québec

Projection cartographique

NAD 83, Québec Lambert

Source

Base de données géographiques, MERN, 2017


0 4,25 8,5 17 25,5 34 Km

1:502 625,34



Ministère des Forêts,
de la Faune
et des Parcs
Québec

Tendance de la population



Recrutement

